

AM120 2013 Settimana 7

SUCCESSIONI E SERIE DI FUNZIONI

CONVERGENZA UNIFORME.

In generale, le proprietà di regolarità delle f_n non si conservano nel limite puntuale. Se $f_n(x) = x^n$, $x \in [0, 1]$ le f_n sono continue, ma il loro limite non lo è; se $f_n(x) = x \arctan(nx)$, le f_n sono derivabili, ma il loro limite, $f(x) = \frac{\pi}{2}|x|$, non lo è. E se $f_n(x) = \frac{\arctan(nx)}{n}$, il loro limite è sì derivabile, ma non è la derivata del limite delle f'_n : $\chi_{\{0\}} = \lim_n f'_n \neq (\lim_n f_n)' = 0!$ Occorre una nozione di *convergenza più forte*: f_n si dice **uniformemente convergente in E** ad f se

$$\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow_{n \rightarrow \infty} 0$$

La $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ è **serie uniformemente convergente in E** se la successione delle somme parziali $S_n(x) := \sum_{j=1}^n a_j(x)$ converge uniformemente in E .

ESEMPLI. 1. La successione $f_n(x) = x^n$ converge uniformemente a zero in $[0, a]$ se $0 < a < 1$, ma la convergenza **non è uniforme** in $[0, 1]$. Infatti

$$\sup_{x \in [0, a]} x^n = a^n \rightarrow 0 \quad \text{mentre} \quad \sup_{x \in [0, 1]} x^n = 1$$

2. (**Traslazioni**). Sia f una funzione (non identicamente nulla) nulla fuori di $(0, 1)$. Siano $f_n(x) := f(x - n)$ le traslate di f . Allora $f_n(x) \rightarrow_{n \rightarrow \infty} 0$ $\forall x \in \mathbf{R}$, ma la convergenza **non è uniforme**, giacché $\sup_{\mathbf{R}} |f_n| = \sup_{\mathbf{R}} |f|$.

3. (**Cambi di scala**). Sia f una funzione (non identicamente nulla) nulla fuori di $(0, 1)$. Siano $f_n(x) := f(nx)$. Allora $f_n(x) \rightarrow_{n \rightarrow \infty} 0$, $\forall x \in \mathbf{R}$, ma la convergenza **non è uniforme**, giacché $\sup_{\mathbf{R}} |f_n| = \sup_{\mathbf{R}} |f|$.

4. $f_n(x) := \min\{n, \frac{1}{x}\} \rightarrow_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x}$, $\forall x \in (0, 1]$, ma la convergenza **non è uniforme** in $(0, 1]$. Infatti $\sup_{(0, 1]} \frac{1}{x} = +\infty$ mentre vale chiaramente la seguente **Proprietà**. $\sup_{x \in E} |f_n(x)| < +\infty$, $f_n \rightarrow_{n \rightarrow \infty} f$ uniformemente in $E \Rightarrow \sup_{x \in E} |f(x)| < +\infty$

Condizione di Cauchy uniforme. Se f_n converge uniformemente ad f in E , allora f_n è **Cauchy uniforme**, nel senso che

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists n_\epsilon : \sup_{x \in E} |f_n(x) - f_m(x)| \leq \epsilon \quad \forall n, m \geq n_\epsilon$$

Il criterio di Cauchy.

f_n é uniformemente convergente in E sse la f_n é **Cauchy uniforme** in E .

NECESSITÁ: $f_n \rightarrow f$ uniformemente in $E \Rightarrow$
 $\exists n_\epsilon : |f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| \leq \epsilon \forall x \in E$ se $n, m \geq n_\epsilon$.

SUFFICENZA: intanto, per ogni fissato x in E , la successione $n \rightarrow f_n(x)$ é di Cauchy, e quindi $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ esiste finito per ogni x in E .

Poi, dall'ipotesi, fissato $\epsilon > 0$, $\exists n_\epsilon$ tale che

$$|f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(x) - f_{n+p}(x)| + |f_{n+p}(x) - f(x)| \leq \epsilon + |f_{n+p}(x) - f(x)| \quad \forall x \in E$$

se $n \geq n_\epsilon$ e quale che sia $p \in \mathbf{N}$. Fissato $n \geq n_\epsilon$ e mandando p all'infinito in $|f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon + |f_{n+p}(x) - f(x)| \quad \forall x \in E$ si ottiene $|f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon \quad \forall x \in E$ e per ogni $n \geq n_\epsilon$ cioè f_n converge uniformemente ad f .

Criterio di Cauchy per le serie . $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ converge uniformemente in E sse

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon : n \geq n_\epsilon, p \in \mathbf{N} \Rightarrow \sup_{x \in E} \left| \sum_{j=n}^{n+p} a_j(x) \right| \leq \epsilon$$

Teorema 1 (la convergenza uniforme conserva la continuitá).

$$f_n \in C(E), \quad f_n \rightarrow_n f \quad \text{uniformemente in } E \quad \Rightarrow \quad f \in C(E)$$

Dimostrazione. Fissato $\epsilon > 0$ siano $n_\epsilon, \delta_\epsilon > 0$ tali che

$$|f_{n_\epsilon}(x) - f(x)| \leq \epsilon, \quad \forall x \in E, \quad |f_{n_\epsilon}(x) - f_{n_\epsilon}(x_0)| \leq \epsilon \quad \forall x \in E, |x - x_0| \leq \delta_\epsilon.$$

Allora

$$|f(x) - f(x_0)| \leq 2\epsilon, \quad \forall x \in E, |x - x_0| \leq \delta_\epsilon$$

NOTA 1. Se la convergenza non é uniforme il limite può non essere continuo.

Esempi:

1. $f_n(x) = x^n$, $x \in [0, 1]$ converge (puntualmente) in $[0, 1]$ a $\chi_{\{1\}}$, la funzione caratteristica dell'insieme $\{1\}$ (ovvero alla funzione che vale 1 nel punto 1 e zero altrove).

2. $f_n(x) = \frac{1}{1+nx^2}$ converge puntualmente alla funzione, discontinua in zero, $\chi_{\{0\}}$.

3. $f_n(x) = \arctan(nx) \rightarrow \frac{\pi}{2}\chi_{(0,+\infty)} - \frac{\pi}{2}\chi_{(-\infty,0)}$. Siccome la funzione limite é discontinua (in zero), la convergenza non può essere uniforme.

Continuitá del limite, equicontinuitá e convergenza uniforme.

Funzioni equicontinue in E . La continuitá del limite si puó anche ottenere, alternativamente, nell'ipotesi di *equicontinuitá*: le f_n sono equicontinue in E se

$$\forall x_0 \in E, \forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta_\epsilon : \sup_n |f_n(x) - f_n(x_0)| \leq \epsilon \quad \text{se} \quad |x - x_0| \leq \delta$$

Infatti, $f_n(x) \rightarrow f(x) \forall x \in E$, f_n equicontinua in $x_0 \Rightarrow f$ continua in x_0

giacché $|f_n(x) - f_n(x_0)| \leq \epsilon$ se $|x - x_0| \leq \delta$ implica, passando al limite per ogni fissato x con $|x - x_0| \leq \delta$, $|f(x) - f(x_0)| \leq \epsilon$.

Un esempio importante di funzioni equicontinue é dato dalle

Funzioni equilipschitziane f_n sono *equiLip* in $[a, b]$ se

$$\exists L > 0 : |f_n(x) - f_n(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in [a, b]$$

Dal Teorema di Lagrange segue subito che se $f_n \in C^1([a, b])$ allora

$$\sup_{x \in [a, b]} |f'_n(x)| \leq L \quad \forall n \in \mathbf{N} \Rightarrow f_n \text{ sono equiLip}$$

Cé uno stretto legame, nella classe delle funzioni continue, tra convergenza uniforme ed equicontinuitá:

Proposizione . Siano $f_n \in C([a, b])$, $f_n(x) \rightarrow f(x) \quad \forall x \in [a, b]$. Allora

(i) $f_n \rightarrow f$ uniformemente in $[a, b] \Rightarrow f_n$ é equicontinua in $[a, b]$

(ii) f_n equiLip $\Rightarrow f_n$ converge uniformemente a f

Prova di (i). Fissato $x_0 \in [a, b]$, si ha

$$|f_n(x) - f_n(x_0)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f(x_0)| + |f(x_0) - f_n(x_0)| \leq 3\epsilon$$

se $|x - x_0| \leq \delta$ ed $n \geq n_\epsilon$. Rimpicciolendo eventualmente $\delta > 0$, é anche

$$|f_n(x) - f_n(x_0)| \leq \epsilon \quad \forall n = 1, \dots, n_\epsilon \quad \text{se} \quad |x - x_0| \leq \delta$$

Prova di (ii). Fissato $\epsilon > 0$, siano $x_0 = a, x_1 = x_0 + \frac{b-a}{k}, \dots, x_k = x_0 + \frac{k(b-a)}{k} = b$, con k tale che $L \frac{b-a}{k} \leq \epsilon$. Preso $x \in [a, b]$, sará $x \in [x_j, x_{j+1})$ per qualche j . Siccome $f_n(x_j) \rightarrow f(x_j) \quad \forall j = 0, \dots, k$, si puó trovare n_ϵ tale che $|f_n(x_j) - f_m(x_j)| \leq \epsilon \quad \forall j = 0, \dots, k$. Allora

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f_n(x_j)| + |f_n(x_j) - f_m(x_j)| + |f_m(x_j) - f_m(x)| \leq 3\epsilon$$

Il Teorema di Ascoli-Arzelá. Siano $f_n \in C([a, b])$ tali che

- (i) $\exists M > 0 : \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x)| \leq M$ (**equilimitatezza**)
(ii) $\exists L > 0 : |f_n(x) - f_n(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in [a, b]$ (**equilipschitzianitá**)

Allora esistono f_{n_k} ed f tali che $f_{n_k} \rightarrow f$ uniformemente in $[a, b]$.

Prova. Sia $D \subset [a, b]$ sottoinsieme numerabile denso. Dalla uniforme limitatezza di f_n deriviamo, usando l'argomento diagonale di Cantor, l'esistenza di una sottosuccessione f_{n_k} tale che $f(x) := \lim_{k \rightarrow +\infty} f_{n_k}(x)$ esiste finito per ogni $x \in [a, b]$.

Da $|f_n(x) - f_n(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in [a, b], \forall n \in \mathbf{N}$ segue, passando al limite, che $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in D \subset [a, b]$: f é uniformemente continua. Dalla uniforme continuitá di f in D , segue che f si puó prolungare ad una funzione, che continuiamo a indicare con f , Lip su tutto $[a, b]$. Resta da provare che f_{n_k} converge ad f su tutto $[a, b]$ (la convergenza sará poi anche uniforme perché f_n é equiLip). Sia dunque $x \in [a, b]$, $x_j \in D, x_j \rightarrow_j x$. Allora

$$\begin{aligned} |f_{n_k}(x) - f(x)| &\leq |f_{n_k}(x) - f_{n_k}(x_j)| + |f_{n_k}(x_j) - f(x_j)| + |f(x_j) - f(x)| \leq \\ &\leq 2L|x - x_j| + |f_{n_k}(x_j) - f(x_j)| \quad \Rightarrow \quad \limsup_k |f_{n_k}(x) - f(x)| \leq 2L|x - x_j| \quad \forall j \end{aligned}$$

e quindi $\limsup_k |f_{n_k}(x) - f(x)| \leq 0$ e quindi $f_{n_k}(x) \rightarrow_k f(x)$.

Teorema 2 (il limite delle derivate é la derivata del limite).

Siano I intervallo aperto, $f, g : I \rightarrow \mathbf{R}$, $f_n \in C^1(I)$ tali che
 $f_n(x) \rightarrow_n f(x)$ e $f'_n(x) \rightarrow_n g(x)$ in I . Allora

$$f'_n \rightarrow_n g \quad \text{uniformemente in } I \quad \Rightarrow \quad f \in C^1(I) \quad \text{e} \quad (\lim_n f_n)' \equiv \lim_n f'_n$$

Prova. Fissato $x \in I$, se $h + x \in I$, $\exists t = t(n, h) \in (0, 1) : \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - g(x) \right| =$

$$= \lim_n \left| \frac{f_n(x+h) - f_n(x)}{h} - f'_n(x) \right| = \lim_n |f'_n(x + t(n, h)h) - f'_n(x)|$$

D'altra parte, f'_n converge uniformemente a g e g é continua (perché le f'_n lo sono) implicano che $\forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbf{N}, \delta_\epsilon > 0 : |f'_n(x + t(n, h)h) - f'_n(x)| \leq$

$$\leq |f'_n(x + t(n, h)h) - g(x + t(n, h)h)| + |g(x + t(n, h)h) - g(x)| + |g(x) - f'_n(x)| \leq 3\epsilon$$

NOTA. La convergenza uniforme delle f'_n é essenziale. Controesempi:

Sia $f_n(x) := |x|^{1+\frac{1}{n}}$, $x \in (-1, 1)$. È $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = |x|$ (limite uniforme!) che non è derivabile in $x = 0$ anche se le f_n sono di classe C^1 . Notare che $f'_n(x) = (1 + \frac{1}{n}) \frac{x}{|x|} |x|^{\frac{1}{n}} \rightarrow_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{|x|}$, per $x \neq 0$ e $f'_n(0) \rightarrow_n 0$ (convergenza non uniforme!)

Sia $f_n(x) = \frac{1}{n} \arctan(nx)$, successione (uniformemente) convergente a zero in \mathbf{R} di funzioni di classe C^1 . È $f'_n(x) = \frac{1}{1+n^2x^2} \rightarrow_{n \rightarrow \infty} \chi_{\{0\}}$. Dunque la derivata del limite non è (in $x = 0$) il limite delle derivate.

Derivazione termine a termine nelle serie di funzioni.

(i) Siano $a_n \in C([a, b])$. Se la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ è uniformemente convergente in $[a, b]$, allora $S(x) := \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ è continua in $[a, b]$.

(ii) Siano $a_n \in C^1(I)$. Se la serie di funzioni $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ converge in I e la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a'_n(x)$ converge uniformemente in I , allora

$$\frac{d}{dx} \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{da_n}{dx}(x)$$

SERIE TOTALMENTE CONVERGENTI

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ è totalmente convergente in E se $\sum_{n=1}^{\infty} \sup_{x \in E} |a_n(x)| < +\infty$

La totale convergenza implica l'uniforme convergenza:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sup_{x \in E} |a_n(x)| < +\infty \Rightarrow \left| \sum_{j=n}^{n+p} a_j(x) \right| \leq \sum_{j=n}^{n+p} |a_j(x)| \leq \sum_{j=n}^{n+p} \sup_{x \in E} |a_j(x)| \leq \epsilon \quad \forall x \in E$$

ESEMPI di serie uniformemente convergenti ma non totalmente convergenti:

1. Se $a_n(x) \equiv \frac{(-1)^n}{n}$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ converge, ovviamente in modo uniforme, ma non è totalmente convergente, perché $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n(x)| = +\infty$.

2. sia $f \in C(\mathbf{R})$, nulla fuori di $(0, 1)$, $a_n(x) := \frac{1}{n} f(x - n)$.

La serie di funzioni $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} f(x - n)$ converge alla funzione $S(x)$ che vale $\frac{1}{n} f(x - n)$ in $[n, n + 1]$ e zero se $x \leq 0$. Inoltre la convergenza è uniforme in \mathbf{R} , perché $|S(x) - S_n(x)| = \left| \sum_{j>n} \frac{1}{j} f(x - j) \right| \leq \frac{1}{n+1} \sup_{\mathbf{R}} |f| \rightarrow 0$.

La convergenza però non è totale, perché $\sup_{x \in \mathbf{R}} |a_n(x)| = \frac{1}{n} \sup_{x \in \mathbf{R}} |f(x)|$.

Convergenza totale delle serie di potenze. Se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ha raggio di convergenza r , allora $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ converge totalmente in $[-\delta, \delta]$, $\forall \delta < r$:

$$\sup_{|x| \leq \delta} |a_n x^n| = |a_n| \delta^n \quad \text{e} \quad \sum_0^{\infty} |a_n| \delta^n < +\infty$$

La somma di una serie di potenze é una funzione C^∞ .

Le $a_n(x) := a_n x^n$ sono funzioni C^∞ e la serie delle derivate k -esime

$$\sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\dots(n-k+1)a_n x^{n-k} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(j+k)!}{j!} a_{j+k} x^j$$

é anch'essa serie di potenze ed il suo raggio di convergenza é

$$\left(\limsup_n |n(n-1)\dots(n-k+1)a_n|^{1/n}\right)^{-1} = \left(\limsup_n |a_n|^{1/n}\right)^{-1}$$

ESEMPIO: $\frac{k!}{(1-x)^{k+1}} = \frac{d^k}{dx^k} \left(\frac{1}{1-x}\right) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(j+k)!}{j!} x^j, \quad \forall x \in (-1, 1).$

Criterio di Leibnitz. Se $0 \leq a_{n+1}(x) \leq a_n(x) \quad \forall x \in E, n \in \mathbf{N}$, allora

$$\sup_{x \in E} a_n(x) \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n a_n(x) \text{ converge uniformemente in } E$$

Intanto, la serie converge puntualmente in E per il criterio di Leibnitz per le serie numeriche. La convergenza é anche uniforme perché

$$-a_{2n-1}(x) \leq \sum_{k=2n-1}^{+\infty} (-1)^k a_k(x) \leq 0, \quad a_{2n}(x) \geq \sum_{k=2n}^{+\infty} (-1)^k a_k(x) \geq 0 \quad \forall x \in E \Rightarrow$$

$$\left| \sum_{k=n}^{+\infty} (-1)^k a_k(x) \right| \leq a_n(x) \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0 \quad \text{uniformemente in } E$$

Teorema di Abel . Siano f_n, g_n tali che

- (i) $f_{n+1}(x) \leq f_n(x) \geq 0$ (opp. $f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$) $\forall x \in E, \forall n$
- (ii) $\exists M > 0 : |f_n(x)| \leq M \quad \forall x \in E, \forall n$
- (ii) $\sum_n g_n$ é uniformemente convergente in E .

Allora $\sum_n f_n g_n$ é uniformemente convergente in E .

Corollario. Se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ha raggio di convergenza r e $\sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n$ converge allora la convergenza della serie é uniforme in $[0, r]$. In particolare, $f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ é continua anche in $x = r$.

Deduzione del Corollario. Sia r il raggio di convergenza di $\sum_n a_n x^n$. Scrivendo $\sum_n a_n x^n = \sum_n b_n y^n$ con $b_n = a_n r^n, y = \frac{x}{r}$, possiamo supporre che $r = 1$. Cambiando eventualmente x in $-x$, possiamo supporre che la serie converga in $x = 1$. Posto $f_n = x^n$ e $g_n = a_n$, un'applicazione di Abel dá il Corollario.

Esempio. Per Leibnitz, $f(x) := \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ é definita in $(-1, 1]$ ed é ivi continua per Abel. Da $f(x) = \log(1+x)$ in $(-1, 1)$, segue, per continuitá, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \log 2$.

Dimostrazione del Teorema di Abel.

Si basa sulla seguente identitá di Abel (che si prova facilmente per induzione):

$$\forall \alpha_k, \beta_k \in \mathbf{C}, p \in \mathbf{N} : \quad \sum_{k=1}^p \alpha_k \beta_k = \alpha_p \sum_{k=1}^p \beta_k + \sum_{k=1}^{p-1} (\alpha_k - \alpha_{k+1}) \sum_{j=1}^k \beta_j$$

Osservato che la monotonia di $n \rightarrow f_n(x) \quad \forall x \in E$ implica che $\sum_{k=1}^p |f_{n+k} - f_{n+k+1}| = |f_{n+1} - f_{n+p}|$ (somma telescopica), l'identitá di Abel dá subito

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^p f_{n+k} g_{n+k} \right| &= \left| f_{n+p} \sum_{k=1}^p g_{n+k} + \sum_{k=1}^{p-1} (f_{n+k} - f_{n+k+1}) \sum_{j=1}^k g_{n+j} \right| \leq \\ &\leq |f_{n+p}| \left| \sum_{k=1}^p g_{n+k} \right| + \max_k \left| \sum_{j=1}^k g_{n+j} \right| \sum_{k=1}^{p-1} |f_{n+k} - f_{n+k+1}| = \\ &= |f_{n+p}| \left| \sum_{k=1}^p g_{n+k} \right| + \max_k \left| \sum_{j=1}^k g_{n+j} \right| |f_{n+1} - f_{n+p}| \leq 3M\epsilon \quad \forall n \geq n_\epsilon \end{aligned}$$

ove $n \geq n_\epsilon \Rightarrow \left| \sum_{j=1}^k g_{n+j} \right| \leq \epsilon \quad \forall k, \forall x \in E$.

Teorema di Dini 1 Siano $f_n, f \in C([a, b])$, $f_{n+1}(x) \geq f_n(x) \quad \forall n \in \mathbf{N}, x \in [a, b]$ (oppure $f_{n+1}(x) \leq f_n(x) \quad \forall n \in \mathbf{N}, x \in [a, b]$). Allora

$$f_n(x) \rightarrow f(x) \quad \forall x \in [a, b] \quad \Rightarrow \quad f_n \quad \text{converge uniformemente in } [a, b]$$

Teorema di Dini 2 Siano f_n definite e monotone (crescenti o decrescenti) in $[a, b]$, $f \in C([a, b])$. Allora

$$f_n(x) \rightarrow f(x) \quad \forall x \in [a, b] \quad \Rightarrow \quad f_n \quad \text{converge uniformemente in } [a, b].$$

NOTA In entrambi i casi l'ipotesi che f sia continua é essenziale, come mostra la successione di funzioni crescenti $f_n(x) = x^n, x \in [0, 1]$, che tendono in modo monotono alla funzione (discontinua!) $f(x) = \chi_{\{1\}}$.

NOTA Le $f_n(x) = x^n, x \in [0, 1)$ sono crescenti e convergono in modo monotono alla funzione nulla, ma la convergenza non é uniforme in $[0, 1)$.

NOTA Le $f_n(x) = e^{x-n}$ sono crescenti e convergono in modo monotono alla funzione continua $f = 0$ su tutto \mathbf{R} , ma la convergenza non é uniforme (su tutto \mathbf{R}).

ESEMPI, PROBLEMI E COMPLEMENTI.

1. Proprietá di $f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}, \quad x > 0$

La f é continua perché la serie converge totalmente in $[1 + \delta, +\infty)$, $\forall \delta > 0$:

$$x \geq 1 + \delta \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{n^x} \leq \frac{1}{n^{1+\delta}} \quad \text{e} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\delta}} < +\infty$$

e siccome la serie delle derivate $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{\log n}{n^x}$ é ugualmente totalmente convergente in $[1 + \delta, +\infty)$, $f'(x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log n}{n^x}$. In particolare, f é decrescente, e quindi esiste $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow 1^+} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^x} \quad \forall N$ e quindi $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$. Piú precisamente, come vedremo,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x} \geq \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^x} = \frac{1}{x-1}$$

Ció comporta, in particolare, che la convergenza non é uniforme in $(1, +\infty)$, giacché

Limitatezza del limite uniforme Se f_n sono limitate ed uniformemente convergenti ad f in A , allora f 'e limitata in A .

Infatti, $\exists n_0 : |f(x)| \leq |f(x) - f_{n_0}(x)| + |f_{n_0}(x)| \leq 1 + \sup_{x \in A} |f_{n_0}(x)|, \quad \forall x \in A.$

Che la convergenza non sia uniforme in $[0, \delta]$ segue anche dal fatto

Convergenza al bordo Se $f_n \in C([a, b])$ allora

$$\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \quad \text{converge uniformemente in} \quad [a, b] \quad \Rightarrow \quad \sum_{n=0}^{\infty} f_n(a) \quad \text{converge}$$

Infatti, $\forall \epsilon > 0, \exists N_{\epsilon} : \max_{x \in [a, b]} \left| \sum_{n=N}^{N+p} f_n(x) \right| \leq \epsilon, \quad \forall N \geq N_{\epsilon}, p \in \mathbf{N}$ e quindi

$$\left| \sum_{n=N}^{N+p} f_n(a) \right| = \lim_{x \rightarrow a^+} \left| \sum_{n=N}^{N+p} f_n(x) \right| \leq \epsilon.$$

Vediamo ora che $\sum_{j=2}^{\infty} \frac{1}{n^x} \rightarrow_{x \rightarrow +\infty} 0$. Questo fatto si può derivare dalla

Comportamento asintotico Se f_n converge uniformemente ad f in $[a, +\infty)$ ed $f_n(x) \rightarrow_{x \rightarrow +\infty} 0 \quad \forall n$, allora $f(x) \rightarrow_{x \rightarrow +\infty} 0$.

Infatti, $|f(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f_n(x)| \leq \epsilon + |f_n(x)|$ se $n \geq n_\epsilon$ e quindi $\limsup_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| \leq \epsilon, \forall \epsilon > 0$.

Infine, $f \in C^\infty((1, +\infty))$: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{d^k}{dx^k} \frac{1}{n^x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^k (\log n)^k}{n^x}$ converge totalmente in $[1 + \delta, +\infty)$, perché $x \geq 1 + \delta \Rightarrow \frac{(\log n)^k}{n^x} \leq \frac{(\log n)^k}{n^{1+\delta}}$ e $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\log n)^k}{n^{1+\delta}} < +\infty$.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} x^n e^{-nx} = \frac{x^r}{1-e^{-x}}$ converge totalmente in $[0, +\infty)$ se e solo se $r > 1$:
 $(x^r e^{-nx})' = r x^{r-1} e^{-nx} - n x^r e^{-nx} = 0 \Rightarrow x = \frac{r}{n} \Rightarrow \sup_{x \geq 0} x^r e^{-nx} = \left(\frac{r}{n}\right)^r e^{-r}$
 Ma $\sum_{n=N}^{\infty} x^r e^{-nx} = \frac{e^{-Nx} x^r}{1-e^{-x}} \leq \left(\frac{2r}{N}\right)^r \frac{e^{-2r}}{1-e^{-\frac{2r}{N}}}$: la convergenza é uniforme in $[0, +\infty) \forall r > 0$

3. Sia $f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}, |x| < 1$. Calcolare $\frac{d}{dx}[x^2 f'(x)]$, determinare f .

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n+1} \Rightarrow x^2 f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} \Rightarrow \frac{d}{dx}[x^2 f'(x)] = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1 \\ \Rightarrow f'(x) &= -\frac{1}{x} - \frac{\log(1-x)}{x^2} = -\frac{1}{x} + \left(\frac{\log(1-x)}{x}\right)' + \frac{1}{x(1-x)} = \left(\frac{\log(1-x)}{x}\right)' + \frac{1}{1-x} \\ &\Rightarrow f(x) = \frac{\log(1-x)}{x} - \log(1-x) + 1 \end{aligned}$$

Teorema di Dini 1 Siano $f_n, f \in C([a, b]), f_{n+1}(x) \geq f_n(x) \forall n \in \mathbf{N}, x \in [a, b]$ (oppure $f_{n+1}(x) \leq f_n(x) \forall n \in \mathbf{N}, x \in [a, b]$). Allora

$$f_n(x) \rightarrow f(x) \quad \forall x \in [a, b] \quad \Rightarrow \quad f_n \quad \text{converge uniformemente in } [a, b]$$

Prova. Siano $f_n(x_n) = \max f_n$ e supponiamo per assurdo che $f_n(x_n) \geq r > 0$ per infiniti indici. Eventualmente passando ad una sottosuccessione, possiamo supporre che $x_n \rightarrow x_0$ per un x_0 e $f_n(x_n) \geq r \forall n$.

Sia n_0 tale che $f_{n_0}(x_0) \leq \frac{r}{4}$ e $\delta(n_0)$ tale che $f_{n_0}(x) \leq \frac{r}{2}$ se $|x - x_0| \leq \delta(n_0)$. Ma allora $f_n(x) \leq \frac{r}{2} \forall n \geq n_0$ e $|x - x_0| \leq \delta(n_0)$ e quindi anche in x_n , se n é abbastanza grande, contraddizione.

Teorema di Dini 2 Siano f_n definite e monotone (crescenti o decrescenti) in $[a, b], f \in C([a, b])$. Allora

$$f_n(x) \rightarrow f(x) \quad \forall x \in [a, b] \quad \Rightarrow \quad f_n \quad \text{converge uniformemente in } [a, b].$$

Prova. Dato $\epsilon > 0, \exists \delta = \delta_\epsilon > 0: x, y \in [a, b], |x - y| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \epsilon$. Sia N tale che $\frac{b-a}{N} \leq \delta$. Sia $x_0 = a, \dots, x_j = x_0 + j \frac{b-a}{N}, \dots, x_N = x_0 + N \frac{b-a}{N} = b$ suddivisione di $[a, b]$ in N parti uguali. Sia infine n_ϵ tale che

$$\begin{aligned} |f_n(x_j) - f_n(x_{j+1})| &\leq \epsilon \quad \forall n \geq n_\epsilon, \forall j = 1, \dots, N \quad \text{e, se } x \in [a, b], \text{ sia } j \text{ tale che} \\ x &\in [x_j, x_{j+1}]. \text{ Dalla monotonia: } -2\epsilon \leq f_n(x_j) - f(x_j) + f(x_j) - f(x) \leq \\ &\leq f_n(x) - f(x) \leq f_n(x_{j+1}) - f(x_{j+1}) + f(x_{j+1}) - f(x) \leq 2\epsilon. \end{aligned}$$